

บัญชีรายการยาโรงพยาบาลชื่นชม

ปี งบประมาณ 2568

จำนวน 349 รายการ

กรอบบัญชียาปีงบประมาณ 2568
หน่วยงาน โรงพยาบาลชินชม จังหวัดมหาสารคาม

| ลำดับ | ประเภท | จำนวนรายการ | | |
|---------------|-------------------------|-------------|-----|--------|
| | | รพ.ชินชม | PCU | รพ.สต. |
| ยาแผนปัจจุบัน | | | | |
| | ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ | 302 | 43 | 79 |
| | ยานอกบัญชียาหลัก | 9 | 3 | 0 |
| ยาสมุนไพร | | | | |
| | ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ | 36 | 13 | 17 |
| | ยานอกบัญชียาหลัก | 2 | 1 | 0 |
| | รวมทั้งสิ้น | 349 | 60 | 96 |

หมายเหตุ กรอบยา PCU กำหนดเงื่อนไข จ่ายเฉพาะวันที่แพทย์ออกตรวจเท่านั้น

(นายยอดพร โปธิคอกไม้)
ผู้รับผิดชอบงาน

(นายพิมพ์พาศย์ ดาตุมมา)
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลชินชม

(นายพิทักษ์พงษ์ พายูหะ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

| ลำดับ | กลุ่มยา/ชื่อยา | ประเภท | บัญชี | VEN | รพช | PCU | รพ.สต | เงื่อนไขการใช้/หมายเหตุ |
|---------------------------|---|--------|-------|-----|-----|-----|-------|---|
| ANTIDOTES | | | | | | | | |
| 1 | Acetylcysteine inj. 300 mg./amp | ED | ก | V | / | | | |
| 2 | Activated charcoal powder | ED | ก | V | / | | | |
| 3 | Adrenaline inj | ED | ก | V | / | / | | |
| 4 | Atropine sulfate | ED | ก | V | / | / | | ตัดออกกรอบ รพ.สต. |
| 5 | Calcium gluconate 1 gm./10 ml | ED | ก | V | / | / | | ตัดออกกรอบ รพ.สต. |
| 6 | Kayexalate powder (Cal polystyrene pow) | ED | ข | V | / | | | |
| 7 | Nalador(Sulprostone) | ED | ง | V | / | | | severe post-partum hemorrhage |
| 8 | Naloxone hydrochloride | ED | ก | V | / | | | |
| 9 | Sodium bicarbonate inj 7.5% in 50 ml | ED | ก | V | / | / | | |
| Anticoagulants | | | | | | | | |
| 1 | Enoxaparin sodium | ED | ค | E | / | | | นำเข้าปี 2565 เงื่อนไข ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ |
| 2 | Warfarin 3 mg | ED | ค | E | / | | | นำเข้าปี 2566 |
| ANTIINFECTIONS | | | | | | | | |
| AMINOGLYCOCIDES | | | | | | | | |
| 1 | Gentamicin cream 5 g | NED | | N | / | | | |
| CEPHALOSPORINS | | | | | | | | |
| 1 | Cefalexin 250 mg.. | ED | ก | E | / | | | |
| 2 | Cefazolin sodium 1 g. inj | ED | ก | E | / | | | |
| 3 | Ceftriaxone 1 gm inj. | ED | ค | E | / | | | |
| 4 | Cefalexin dry 125 mg/5ml syr 60 ml | ED | ก | E | / | | | |
| 5 | Ceftazidime 1 g. Inj (Fortum) | ED | ค | E | / | | | aeruginosa และ melioidosis |
| MACROLIDES | | | | | | | | |
| 1 | Erythromycin dry syrup 60 ml | ED | ก | E | / | | / | |
| 2 | Roxithromycin 150 mg . | ED | ก | E | / | | / | |
| PENICILLINS | | | | | | | | |
| 1 | Amoxicillin 500 mg.. | ED | ก | E | / | | / | |
| 2 | Amoxicillin dry syrup 250 mg/5 ml | ED | ก | E | / | | / | นำเข้าปี 2563 แทน 125 mg |
| 3 | Ampicillin 1 g. inj | ED | ก | E | / | | | |
| 4 | Dicloxacillin 250 mg. . | ED | ก | E | / | | / | |
| 5 | Dicloxacillin dry syrup | ED | ก | E | / | | / | |
| 6 | Cloxacillin 1 g. inj | ED | ก | E | / | | | |
| QUINOLONES | | | | | | | | |
| 1 | Norfloxacin 400 mg . | ED | ก | E | / | | / | ใช้ตาม CPG RDU |
| 2 | Ofloxacin 200 mg tab | ED | ข | E | / | | | |
| 3 | Levofloxacin 500 mg tab | ED | ง | E | / | | | ใช้ในกรณี TB คีอียา |
| SULFONAMIDES | | | | | | | | |
| 1 | Co-trimoxazole (Bactrim) . | ED | ก | E | / | | | ลดการใช้บ่อยมาก ปี 65 มติคงไว้ |
| 2 | Co-trimoxazole suspension 60 ml | ED | ก | E | / | | | ลดการใช้บ่อยมาก ปี 65 มติคงไว้ |
| TETRACYCLINS | | | | | | | | |
| 1 | Doxycycline HCL 100 mg . | ED | ก | E | / | | | |
| Some other antibacterials | | | | | | | | |

| ลำดับ | กลุ่มยา/ชื่อยา | ประเภท | บัญชี | VEN | รพช | PCU | รพ.สต | เงื่อนไขการใช้/หมายเหตุ |
|-----------------------|--|--------|-------|-----|-----|-----|-------|---|
| 1 | Clindamycin 300 mg cap | ED | ข | E | / | | | |
| 2 | Clindamycin 600 mg/2ml. | ED | ข | E | / | | | |
| 3 | Metronidazole 200 mg tab | ED | ก | E | / | / | | |
| 4 | Metronidazole 500 mg/100 ml. Inj | ED | ก | E | / | | | |
| ANTIMALARIALS | | | | | | | | |
| 1 | Hydroxy Chloroquine sulphate 200 mg. . | ED | ก | E | / | | | แทน Chloroquin 200 mg |
| ANTITUBERCULOUS DRUGS | | | | | | | | |
| 1 | Ethambutol HCL 400 mg. | ED | ก | E | / | | | |
| 2 | Isoniazid 100 mg . | ED | ก | E | / | | | |
| 3 | Pyrazinamide 500 mg. | ED | ก | E | / | | | |
| 4 | Rifampicin 300 mg.. | ED | ก | E | / | | | |
| 5 | Rifampicin 450 mg.. | ED | ก | E | / | | | |
| 6 | Amikacin 500mg/2ml | ED | ก | E | / | | | น้ำเข้า 2566 กรณีเกิดคัมกับอีกเสบ หรือ แพ้ยาจากสูตรรักษามาตรฐาน |
| 7 | Rifinah300(I150+R300) | ED | ก | E | / | | | |
| 8 | Rifinah150(I100+R150) | ED | ก | E | / | | | |
| 9 | Rifafour E-275 | ED | ข | E | / | | | ยาใหม่ 2566 |
| ANTIFUNGALS | | | | | | | | |
| 1 | Fluconazole 200 mg cap | ED | ก | E | / | | | มีข้อควรใช้ต่ำมาก |
| 2 | Griseofulvin 500 mg. . | ED | ก | E | / | | | มีข้อควรใช้ต่ำมาก |
| ANTIVIRALS | | | | | | | | |
| 1 | Acyclovir 400 mg | ED | ก | E | / | | | |
| 2 | Oseltamivir phosphate 30 mg | ED | จ(1) | E | / | | | ข้อให้เหมาะสมกับปริมาณการสั่งใช้ที่ต่ำ |
| 3 | Oseltamivir phosphate 45 mg. | ED | จ(1) | E | / | | | ข้อให้เหมาะสมกับปริมาณการสั่งใช้ที่ต่ำ |
| 4 | Oseltamivir phosphate 75 mg. | ED | จ(1) | E | / | | | |
| ANTIVIRALS | | | | | | | | |
| 1 | Efavirenz 600 mg. | ED | จ(1) | E | / | | | |
| 2 | Molnupiravir 200 mg | NED | | V | / | | | ใช้ในโรคโควิด19 เข้าใหม่ 2566 |
| 3 | Favipiravir 200 mg | NED | | V | / | | | ใช้ในโรคโควิด19 |
| 4 | GPO - vir Z | ED | จ(1) | E | / | | | |
| 5 | Indinavir | ED | จ(1) | E | / | | | |
| 6 | Lamivudine(3TC) lamivir 150 mg | ED | จ(1) | E | / | | | |
| 7 | Lopinavir 200mg/Ritonavir 50 mg | ED | จ(1) | E | / | | | |
| 8 | Nevirapine suspension 10mg/ml | ED | จ(1) | E | / | | | |
| 9 | Ritonavir | ED | จ(1) | E | / | | | |
| 10 | Tenofovir 300 mg | ED | จ(1) | E | / | | | |
| 11 | Zidovudne (AZT 100 mg) | ED | จ(1) | E | / | | | |
| 12 | Zidovudne (AZT 300 mg) | ED | จ(1) | E | / | | | |
| 13 | Zidovudne syrup 10mg/ml 60 cc | ED | จ(1) | E | / | | | |
| 14 | Zidarvir | ED | จ(1) | E | / | | | |
| VIRAL HEPATITIS | | | | | | | | |
| 1 | Lamivudine(3TC) 150 mg | ED | จ(1) | E | / | | | |
| ANTIHELMINTIC | | | | | | | | |

| ลำดับ | กลุ่มยา/ชื่อยา | ประเภท | บัญชี | VEN | รพช | PCU | รพ.สศ | เงื่อนไขการใช้/หมายเหตุ |
|---|--|--------|-------|-----|-----|-----|-------|---|
| 1 | Albendazole 200 mg. | ED | ก | E | / | | / | |
| 2 | Albendazole sus. 20 ml. | ED | ก | E | / | | / | ปี65 คงไว้ จัดซื้อให้เหมาะสมกับการสั่งใช้ |
| 3 | Praziquantel 600 mg tab | ED | ก | E | / | | / | สำหรับโครงการคัดกรองรักษาพยาธิใบไม้ตับ |
| 4 | Ivermectin 6 mg | ED | ข | E | / | | | Strongyloidiasis ชนิดแพร่กระจาย ยาใหม่ 2566 |
| ANTIEPTIC AND DISINFECTANTS | | | | | | | | |
| 1 | Chlorhexidine scrub solution 4 % | ED | ก | E | / | | / | |
| 2 | Chlorhexidine solution 2 % | ED | ก | E | / | | | สำหรับใช้ในห้องฉุกเฉิน |
| 3 | Chlorhexidine solution 0.12 % Dental oral solution | ED | ก | E | / | | | สำหรับทางทันตกรรม |
| 4 | Ethyl alcohol 70 % 60 ml | ED | ก | E | / | | / | |
| 5 | Ethyl alcohol 70% 450 ml | ED | ก | E | / | | / | |
| 6 | Ethyl alcohol 95 % 18 liter | ED | ก | E | / | | / | |
| 7 | Povidone iodine sol 450 ml | ED | ก | E | / | | / | |
| 8 | Povidone iodine sol 30 ml | ED | ก | E | / | | / | |
| ANTIPLATET DRUGS | | | | | | | | |
| 1 | Aspirin 81 mg. entericcoated . | ED | ก | V | / | / | | |
| 2 | Aspirin 300 mg. entericcoated . | ED | ก | V | / | / | | |
| 3 | Clopidogrel bisulfate 75 mg. | ED | ง | V | / | | | ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินที่ER |
| Fibrinolytic drugs | | | | | | | | |
| 1 | Streptokinase inj 1.5 MU | ED | ก | V | / | | | ใช้ตามแนวทาง Service plan |
| HEMOSTATIC AND BLOOD COAGULATIONS | | | | | | | | |
| 1 | Vit.K1 mg./ml inj.1 amp. | ED | ก | V | / | | | รายการยาใช้น้อย |
| 2 | Vit.K10 mg./ml inj.1 amp. | ED | ก | V | / | | | |
| ANTIARRHYTHMIC AGENT | | | | | | | | |
| 1 | Adenosine 6 mg./2ml. | ED | ก | E | / | | | |
| 2 | Amiodarone hydrochloride inj (Cordarone) 150 mg. | ED | ค | V | / | | | |
| 3 | Magnesium sulfate 10% in 10 ml inj | ED | ก | E | / | | | |
| 4 | Magnesium sulfate 50 % in 2 ml. Inj | ED | ก | V | / | | | |
| Lipid-regulating drugs | | | | | | | | |
| 1 | Gemfibrozil 300 mg. Tab | ED | ก | E | / | / | | ปีงบประมาณ 2565 ลดการซื้อให้น้อยลงตามปริมาณการใช้ |
| 2 | Simvastatin 20 mg tab | ED | ก | E | / | / | | |
| 3 | Atorvastatin 40 mg | ED | ข | E | / | | | ยาเข้าใหม่ 2566 ต้องทำ DUE |
| CARDIOVASCULAR DRUG | | | | | | | | |
| CARDIAC GLYCOCIDE(Positive Inotropic drugs) | | | | | | | | |
| 1 | Digoxin 0.25 mg . | ED | ก | V | / | | | |
| 2 | Digoxin 0.25 mg/ml in 2 ml | ED | ก | V | / | | | |
| CARDIAC STILMULANTS(Inotropic sympathomimetics) | | | | | | | | |

| ลำดับ | กลุ่มยา/ชื่อยา | ประเภท | บัญชี | VEN | รพช | PCU | รพ.สต | เงื่อนไขการใช้/หมายเหตุ |
|---|--|--------|-------|-----|-----|-----|-------|--|
| 1 | Dopamine HCL 250 mg in 10 ml inj | ED | ก | V | / | | | |
| 2 | Adrenaline inj. 1 ml. | ED | ก | V | / | / | | |
| Vasoconstrictor Symphatomimetics | | | | | | | | |
| 1 | Norepinepherine inj sterile sol (as bitartrate or hydrochlorid | ED | ก | V | / | | | ใช้กรณี Dopamine ไม่ได้ผลดี |
| VASODILATORS | | | | | | | | |
| Nitrates | | | | | | | | |
| 1 | Isosorbide dinitrate 10 mg . | ED | ก | V | / | / | | |
| 2 | Isosorbide dinitrate 5 mg subl. | ED | ก | V | / | / | | |
| VASODILATORS | | | | | | | | |
| 1 | Hydralazine 25mg tablet | ED | ก | E | / | / | | |
| Centrally acting antihypertensive Drugs | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ตัดMehyldopa ออก 2566 ไม่เคยมีเคสใช้ยา |
| BETA BLOCKING AGENT | | | | | | | | |
| 1 | Propranolol HCL 10 mg . | ED | ก | E | / | / | | |
| 2 | Atenolol 50 mg | ED | ก | E | / | / | | |
| CALCIUM ANTAGONISTS | | | | | | | | |
| 1 | Amlodipine 5 mg tab | ED | ก | E | / | / | | |
| 2 | Diltiazem hydrochloride 30 mg. | ED | ข | E | / | / | | |
| 3 | Verapamil 40 mg tab | ED | ก | E | / | / | | |
| 4 | Nicardipine hydrochloride 2mg inj | ED | ค | E | / | | | |
| ACE INHIBITORS | | | | | | | | |
| 1 | Enalapril 5 mg | ED | ก | E | / | / | | |
| 2 | Captopril 25 mg | ED | ก | E | / | | | ใช้เฉพาะห้องฉุกเฉิน |
| Angiotensin II Receptor Blockers (ARBs) | | | | | | | | |
| 1 | Losartan 50 mg.tab | ED | ก | E | / | | | (กรณีผู้ป่วย ใช้ ยากลุ่ม ACEI เกิด ADR ไอ จากยา) |
| ALPHA- ADRENERGIC BLOCKING AGENT | | | | | | | | |
| 1 | Doxazocin 2 mg | ED | ค | E | / | | | พิจารณาใช้รายการนี้แทนPrazocinที่ตัดออก |
| DIURETICS | | | | | | | | |
| 1 | Furosemide 250 mg./25ml.high dose | ED | ก | E | / | | | ปีละครั้งและจัดซื้อให้น้อยลง |
| 2 | Furosemide 500 mg | ED | ก | E | / | | | ปีละครั้งและจัดซื้อให้น้อยลง |
| 3 | Furosemide 40 mg/tab . | ED | ก | E | / | | | (ถอนจากบัญชี รพสต) |
| 4 | Furosemide inj 40 mg/ml in 2 ml | ED | ก | E | / | | | |
| 5 | Hydrochlorothiazide 25 mg . | ED | ก | E | / | / | | |

| ลำดับ | กลุ่มยา/ชื่อยา | ประเภท | บัญชี | VEN | รพช | PCU | รพ.สต | เงื่อนไขการใช้/หมายเหตุ |
|---|--|--------|-------|-----|-----|-----|-------|---|
| 6 | Spirolactone 25 mg. . | ED | ก | E | / | | | ปี65คงไว้และจัดซื้อให้น้อยลง |
| 7 | Amiloride+Hydrochlorothiazide [Moduretic] | ED | ข | E | / | | | (ถอนจากบัญชี รพสต) |
| ANALGESIC AND ANTIPYRETIC | | | | | | | | |
| 1 | Methyl salicylate cream compound | ED | ก | N | / | / | | (เปลี่ยนเป็นยาครอบPCU) |
| 2 | Paracetamol 325 mg. . | ED | ก | N | / | | / | |
| 3 | Paracetamol 500 mg | ED | ก | N | / | | / | |
| 4 | Paracetamol syrup120mg/5ml.(non-alcohol)60 ml. | ED | ก | N | / | | / | |
| NARCOTIC ANALGESICS | | | | | | | | |
| 1 | Fentanyl transdermal patch | ED | ค | V | / | | | ใช้ใน Paliative care |
| 2 | Morphine sulfate 10 mg/ml Inj | ED | ค | V | / | | | |
| 3 | Morphine sulfate 10 mg tab | ED | ค | E | / | | | |
| 4 | Morphine Syrup | ED | ค | E | / | | | |
| 5 | Tramadol capsule 50mg. | ED | ค | E | / | | | |
| 6 | Tramadol inj. | ED | ค | E | / | | | |
| Central nervous System | | | | | | | | |
| Drugs for neuropathic pain | | | | | | | | |
| 1 | Amitriptyline 10 mg . | ED | ก | E | / | | | |
| 2 | Amitriptyline 25 mg . | ED | ก | E | / | | | เพิ่มการสั่งใช้โดยเริ่ม 25 มก ขึ้นไป |
| 3 | Carbamazepine 200 mg. | ED | ก | E | / | | | |
| ANTIMIGRAN DRUGS | | | | | | | | |
| 1 | Paracetamol | ED | ก | N | / | | / | |
| 2 | Ibuprofen 400 mg. | ED | ก | N | / | | / | |
| ANTIEPILEPTIC DRUGS | | | | | | | | |
| 1 | Diazepam 10 mg/ml inj | ED | ก | V | / | / | | |
| 2 | Carbamazepine 200 mg. . | ED | ก | E | / | | | |
| 3 | Phenobarbital 30 mg. . | ED | ก | E | / | | | |
| 4 | Phenobarbital 60 mg. . | ED | ก | E | / | | | |
| 5 | Phenytoin sodium 100 mg. . | ED | ก | E | / | | | |
| 6 | Phenytoin sodium 250 mg/5ml. . | ED | ก | V | / | | | |
| 7 | Sodium valproate 200 mg. | ED | ก | E | / | | | |
| Central nervous system stimulants | | | | | | | | |
| 1 | Methylphenidate 10 mg | ED | ค | E | / | | | ตามนโยบาย service plan สมาชิกชั้น เข้าใหม่ 2567 |
| Drugs used in psychoses and related disorders | | | | | | | | |
| 1 | Diazepam 10 mg/ml inj | ED | ก | V | / | / | | |
| 2 | Diazepam 5 mg. . | ED | ก | E | / | | | ถอนออกจาก บข รพสต2562 |
| 3 | Lorazepam 0.5 mg. | ED | ก | E | / | | | |

| ลำดับ | กลุ่มยา/ชื่อยา | ประเภท | บัญชี | VEN | รพช | PCU | รพ.สต | เงื่อนไขการใช้/หมายเหตุ |
|--|--|--------|-------|-----|-----|-----|-------|---|
| 4 | Lorazepam 2 mg. | ED | ก | E | / | | | ข้อให้ขึ้นอยู่กับอัตราการใช้ที่ลดลง |
| 5 | Clonazepam 0.5 mg. | ED | ข | E | / | | | |
| 6 | Clonazepam 2 mg. | ED | ข | E | / | | | |
| 7 | Dipotassium clorazepate 5 mg. | ED | ข | E | / | | | |
| ANTIPSYCHOTICS | | | | | | | | |
| 1 | Chlorpromazine hcl 50 mg . | ED | ก | E | / | | | |
| 2 | Clozapine 25 mg. | ED | ค | E | / | | | |
| 3 | Clozapine 100 mg. | ED | ค | E | / | | | |
| 4 | Haloperidol 0.5 mg | ED | ก | E | / | | | |
| 5 | Haloperidol 2 mg. . | ED | ก | E | / | | | |
| 6 | Haloperidol 5 mg . | ED | ก | E | / | | | |
| 7 | Haloperidol inj 5 mg/ml | ED | ก | V | / | | | |
| 8 | Triflazine 5 mg. . | ED | ก | E | / | | | |
| 9 | Fluphenazine 25mg/ml | ED | ก | E | / | | | |
| 10 | Risperidol 2 mg | ED | ค | E | / | | | |
| 11 | Vitamin B 1 100mg | ED | ก | E | / | | | เสนอเพิ่มใหม่ในปีงบประมาณ 2566 ใช้ในกรณี Alcohol Withdrawal Syndrom |
| Antidepressant drugs | | | | | | | | |
| 1 | Amitriptyline 10 mg . | ED | ก | E | / | | | |
| 2 | Amitriptyline HCL 25 mg . | ED | ก | E | / | | | |
| 3 | Fluoxetine 20 mg tap. | ED | ก | E | / | | | เปลี่ยนเป็น tap. ไว้ใช้กรณีเคสเด็ก |
| 4 | Dipotassium Clorazepate(Tranxene) 5 mg.. | ED | ข | E | / | | | |
| 5 | Diazepam 10 mg/ml inj | ED | ก | V | / | | | |
| 7 | Diazepam 5 mg. . | ED | ก | E | / | | | |
| 8 | Lorazepam 0.5 mg. | ED | ก | E | / | | | |
| 9 | Perphenazine 4 mg | ED | ก | E | / | | | |
| 10 | Perphenazine 8 mg. | ED | ก | E | / | | | |
| 11 | Sertralin 50 mg | ED | ค | E | / | | | |
| 12 | Trazodone hydrochloride 50 mg. | ED | ค | E | / | | | |
| DRUG ACTING ON RESPIRATORY SYSTEM | | | | | | | | |
| Drugs used in movement disorder(ANTIPARKINSON DRUGS) | | | | | | | | |
| 1 | Diazepam 5 mg. . | ED | ก | E | / | | | |
| 2 | Propranolol hydrochloride 10 mg. | ED | ก | E | / | | | |
| 3 | Benzhexol 2 mg. . | ED | ก | E | / | | | |
| 4 | Benzhexol 5 mg. . | ED | ก | E | / | | | |
| Drugs Used in smoking cessation | | | | | | | | |
| คัดลอกมียาในกลุ่มสมุนไพรดอกขาวทดแทน | | | | | | | | |
| Drugs Used in nausea and vomiting | | | | | | | | |
| 1 | Domperidone 10 mg tab | ED | ก | N | / | | / | |
| 2 | Domperidone 5 mg/5ml susp | ED | ก | N | / | | / | |

| ลำดับ | กลุ่มยา/ชื่อยา | ประเภท | บัญชี | VEN | รพช | PCU | รพ.สต | เงื่อนไขการใช้/หมายเหตุ |
|---|---|--------|-------|-----|-----|-----|-------|--|
| 3 | Dimenhydrinate 50 mg. tab | ED | ก | N | / | | / | |
| 4 | Dimenhydrinate inj. 50 mg./ml | ED | ก | N | / | | / | |
| 5 | Metoclopramide HCL inj 5 mg/ ml in 2 ml. | ED | ก | N | / | / | | |
| ANTIVERTIGO | | | | | | | | |
| 1 | Dimenhydrinate 50 mg. . | ED | ก | N | / | | | |
| 2 | Dimenhydrinate inj. 50 mg./ml | ED | ก | N | / | | | |
| ENDOCRINENLOGIC DRUGS | | | | | | | | |
| ANTIDIABETICS DRUGS | | | | | | | | |
| 1 | Glipizide 5 MG tab | ED | ก | E | / | / | | |
| 2 | Insulin(NPH) 300 U Penfill | ED | ก | V | / | / | | ลดสัดส่วนการซื้อให้น้อยลง |
| 3 | Insulin(Mixtard) 300 U Penfill | ED | ก | V | / | / | | ใช้เป็นยาหลักในกลุ่มนี้ |
| 4 | Insulin(Regular insulin:RI) 100 U/ml in 10 ml ใช้กับไซริง | ED | ก | V | / | / | | |
| 5 | Metformin 500 mg . | ED | ก | E | / | / | | |
| 6 | Pioglitazone 30 mg | ED | ง | E | / | | | |
| THYRIOD HORMONE | | | | | | | | |
| 1 | Thyroxine sod. 100 mcg | ED | ก | E | / | | | |
| Antithyroid drug | | | | | | | | |
| 1 | Methimazole 5 mg tab | ED | ก | E | / | | | ใช้เป็นอันดับแรก |
| 2 | Propylthiouracil 50 mg . Tab | ED | ก | E | / | | | ใช้กรณีที่ใช้ Methimazole ไม่ได้ |
| SYSTEMIC CORTICOSTEROIDS | | | | | | | | |
| 1 | Dexamethasone inj 4 mg/ml in 1 ml | ED | ก | V | / | / | | |
| 2 | Hydrocortisone 100 mg inj | ED | ก | V | / | | | |
| 3 | Prednisolone 5 mg . | ED | ก | E | / | | | |
| 4 | Triamcinolone acetonide Inj 10 mg./1 ml. | ED | ค | N | / | | | |
| PROGESTOGENS | | | | | | | | |
| 1 | Norethisterone 5 mg. | ED | ก | E | / | | | |
| CONTRACEPTIVE | | | | | | | | |
| 1 | Levonorgestrel 0.15 mg+Ethinylestradiol 0.03 mg (ยาคุมชนิด) | ED | ก | E | / | | / | |
| 2 | Medroxy progesterone(DMPA) 150 mg./3 ml. Inj. | ED | ก | E | / | | / | |
| 3 | Norplant (levonorgestrel) | ED | ก | N | / | | | |
| Prostaglandin,Prostaglandins antagonist | | | | | | | | |
| 1 | Methyletrometrine maleate 0.2 mg/ml in 1 ml inj | ED | ก | V | / | | | ติดตามความต้องการใช้จากแพทย์ในปีงบประมาณ2565 |
| 2 | Oxytocin 10 U/ml in 1 ml Inj | ED | ก | V | / | | | |
| Myometrial relaxants | | | | | | | | |
| 1 | Salbutamol sulfate 2 mg . | ED | ก | E | / | | / | |

| ลำดับ | กลุ่มยา/ชื่อยา | ประเภท | บัญชี | VEN | รพช | PCU | รพ.สต | เงื่อนไขการใช้/หมายเหตุ |
|--|---|--------|-------|-----|-----|-----|-------|---|
| 2 | Terbutaline sulfate inj 0.5 mg/ml in 1 ml | ED | ก | V | / | | | |
| EENT DRUGS | | | | | | | | |
| ANTIINFECTIVE | | | | | | | | |
| 1 | Chloramphenicol Ear drop 1% | ED | ก | E | / | | / | |
| 2 | Chloramphenicol eye drop 1 % | ED | ก | E | / | | / | |
| 3 | Polyxin B sulphate+Neomycin eye drop | ED | ค | E | / | | | ยามีอัตราใช้ต่ำมาก |
| 4 | Tetracycline eye oint. 3 g.(Terramycin) | ED | ก | E | / | | / | |
| Drug for treatment of glaucoma | | | | | | | | |
| 1 | Pilocarpine eye drop 2% | ED | ก | E | / | | | |
| 2 | Timolol maleate 0.5 % 5ml | ED | ก | E | / | | | |
| Local anaesthetics | | | | | | | | |
| 1 | Tetracain Hcl 0.5 % Eye drop | ED | ก | E | / | | | |
| OPHTHALMIC CORTICOSTEROIDS+ANTIINFECTIVE | | | | | | | | |
| 1 | Antazoline+Tetrahydrozoline 1 bot (Hista oph) | ED | ก | E | / | | / | |
| OTHERs | | | | | | | | |
| 1 | Dewax ear drop | NED | | E | / | | | ยาใหม่ 2566 เพิ่ม Compliance |
| GASTROINTESTINAL DRUGS | | | | | | | | |
| ANTACID | | | | | | | | |
| 2 | Aluminium & Mag+Simethicone Suspension(Alum milk) | NED | | N | / | / | | |
| ANTIULCER DRUGS | | | | | | | | |
| 1 | Omeprazole 20 mg cap | ED | ก | N | / | | | 2566 ถอดออกจาก รพ.สต. |
| 2 | Omeprazole 40 mg inj | ED | ข | N | / | | | มีการใช้มากขึ้นจำเป็นต้องระบุ Indication |
| 3 | Famotidine 20 mg tab | ED | ก | E | / | / | | เข้าใหม่ 2566 และแทนOmeprazole ใน รพ.สต. |
| ANTIFLATULENCE AND CARMINATIVE | | | | | | | | |
| 1 | Simethicone Suspension/Drop | ED | ก | N | / | | / | เข้ามาแทนSodiumBicarb syrupปีงบประมาณ2563 |
| 2 | Simethicone 80 mg tab. | ED | ก | N | / | | | ปี 2566 เสนอยาเข้าใหม่ |
| ANTISPASMODIC AND ANTICHOLINERGICS | | | | | | | | |
| 1 | Atropine sulfate 0.6 mg/ml Inj | ED | ก | V | / | | | |
| 2 | Atropine solution eye drop | ED | ค | E | / | | | ให้เพิ่มการสั่งใช้ใน Paliative care |
| 3 | Hyoscine 5 mg./5ml syr. | ED | ก | N | / | | / | |
| 4 | Hyoscine-n-butyl bromide 10 mg . | ED | ก | N | / | | / | |
| 5 | Hyoscine-n-butyl bromide inj 20 mg/ml | ED | ก | N | / | / | | |
| LAXATIVE AND ENEMA | | | | | | | | |

| ลำดับ | กลุ่มยา/ชื่อยา | ประเภท | บัญชี | VEN | รพช | PCU | รพ.สต | เงื่อนไขการใช้/หมายเหตุ |
|---|---|--------|-------|-----|-----|-----|-------|---|
| 1 | Magnesium hydroxide(MOM) | ED | ก | N | / | | / | |
| 2 | Unison enema 133 ml | ED | ก | N | / | / | | |
| HEPATIC ENCEPHALOPATHY | | | | | | | | |
| 1 | Lactulose 100 ml. | ED | ข | E | / | | | |
| ANTIDIARRHOEAL AND ORAL ELECTROLYTE REPLACEMENT | | | | | | | | |
| 1 | O.R.S 4 กรัม | ED | ก | N | / | | / | ปี 2565 เสนอให้มีขนาดเดียว |
| DENTAL AND ORAL PREPERATION | | | | | | | | |
| DENTAL ANTISEPTIC | | | | | | | | |
| 1 | Special mouth wash [chlorhexidine gluconate] C-20 | ED | ก | N | / | | | ใช้ทางทันตกรรม |
| 2 | Betadine gargle | ED | ก | N | / | | | ใช้ทางทันตกรรม |
| DENTAL ANTI INFLAMMATORY | | | | | | | | |
| 1 | Triamcinolone acetonide. Oral base 1 g. | ED | ก | N | / | | / | |
| DERMATOLOGIC DRUG | | | | | | | | |
| TOPICAL ANTI-BACTERIAL | | | | | | | | |
| 1 | Chlorhexidine ก้อนขี้ผึ้งเคลือบขี้ผึ้งป้องกันติดเชื้อ | NED | | N | / | / | | |
| 2 | Silver sulfadiazine cream 1% 25 g | ED | ก | N | / | / | | |
| TOPICAL ANTI-FUNGAL | | | | | | | | |
| 1 | Clotrimazole cream 1% 5gm. | ED | ก | N | / | | / | |
| 2 | Clotrimazole vaginal suppository 100 mg | ED | ก | E | / | / | | |
| SCABICIDES | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ปี 2566 คัด Benzyl benzoate ออกไม่เคมีเอสไอ |
| TOPICAL CORTICOSTEROIDS | | | | | | | | |
| 1 | Prednisolone cream 5% 5gm. | ED | ก | N | / | | / | น้ำเข้าทดแทน TA 0.02% |
| 2 | Triamcinolone acetonide 0.1% 5gm. | ED | ก | N | / | | / | |
| ANTIPRURITICS | | | | | | | | |
| 1 | Calamine lotion 60 ml. | ED | ก | N | / | | / | |
| ANTIHEMORRHOIDAL | | | | | | | | |
| 1 | Proctosedyl suppo 12' s | ED | ก | N | / | | | |
| VACCINES | | | | | | | | |
| 1 | BCG vaccine | ED | ก | V | / | | / | |
| 2 | dT vaccine | ED | ก | V | / | | / | |
| 3 | DTP- HB-Hib vaccine | ED | ก | V | / | | / | |

| ลำดับ | กลุ่มยา/ชื่อยา | ประเภท | บัญชี | VEN | รพช | PCU | รพ.สต | เงื่อนไขการใช้/หมายเหตุ |
|------------------------------------|---|--------|-------|-----|-----|-----|-------|--|
| 4 | DTP- Hepatitis B vaccine | ED | ก | V | / | | / | |
| 5 | DTP vaccine | ED | ก | V | / | | / | |
| 6 | Hepatitis B vaccine | ED | ก | V | / | | / | |
| 7 | HPV (Human papillomavirus vaccine) | ED | จ(1) | E | / | | | ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค |
| 8 | Influenza vaccine | ED | ก | V | / | | / | |
| 9 | IPV vaccine | ED | ก | V | / | | / | |
| 10 | J.E. Vaccine | ED | ก | V | / | | / | |
| 11 | Measles vaccine | ED | ก | V | / | | / | |
| 12 | MMR vaccine | ED | ก | V | / | | / | |
| 13 | OPV vaccine | ED | ก | V | / | | / | |
| 14 | PCV vaccine | ED | ก | V | / | | / | โครงการนำร่อง จ มหาสารคาม เริ่ม กย 64 |
| 15 | Tetanus vaccine 5 ml. | ED | ก | V | / | | / | |
| 16 | Vero vaccine | ED | ก | V | / | | | |
| LOCAL ANESTHETIC | | | | | | | | |
| 1 | Articain HCL 4% with adrenaline | NED | | V | / | / | | |
| 2 | Benzocain Topical anethetic gel | ED | ก | E | / | | / | |
| 3 | Lidocain Hcl 1% whitout epinephine | ED | ก | E | / | | / | |
| 4 | Lidocain Hcl 2% with epinephine | ED | ค | V | / | | / | |
| 5 | Lidocain Viscous Solution 100 ml | ED | ก | N | / | | | |
| 6 | Mepivacain HCL 3% without adrenaline | ED | ก | V | / | | / | |
| NSAIDS | | | | | | | | |
| 1 | Diclofenac 25 mg. . | ED | ก | N | / | | | |
| 2 | Ibuprofen 400 mg | ED | ก | N | / | | / | |
| ANTIGOUT | | | | | | | | |
| 1 | Allopurinol 100 mg. . | ED | ก | E | / | / | | |
| 2 | Colchicine 0.6 mg . | ED | ก | E | / | / | | |
| MUSCLE RELAXANT | | | | | | | | |
| 1 | Tolperisone 50 mg | NED | | N | / | | | นำเข้า 2566 กรณีคนไข้โรคไตที่ไม่สามารถใส่ยาสมุนไพรสังหารยา |
| ANTI ASTHMA and COPD | | | | | | | | |
| BETA 2 AGONIST XANTHINE DERIVATIVE | | | | | | | | |
| 1 | Salbutamol inh. 1 bot. | ED | ก | E | / | | | ถอดออกจากกรอบPCU 2563 |
| 2 | Salbutamol Nebulizer 2.5mg/2.5 ml (กระป๋อง) | ED | ก | V | / | | | ถอดออกจากกรอบPCU 2563 |
| 3 | Salbutamol sulfate 2 mg . | ED | ก | E | / | | | |
| 4 | Salbutamol syrup 60 ml. | ED | | E | / | | | |
| 5 | Terbutaline sulfate inj 0.5 mg/ml in 1 ml | ED | ก | V | / | | | |
| 6 | Theophylline 200 mg/tab | ED | ก | E | / | | | ถอดออกจากกรอบPCU 2563 |
| 7 | Salbutamol Solutions | ED | ก | V | / | | | ใช้ในเคสเด็กเพื่อให้ง่ายต่อการบริหารยา |
| ANTI HISTAMINE | | | | | | | | |

| ลำดับ | กลุ่มยา/ชื่อยา | ประเภท | บัญชี | VEN | รพช | PCU | รพ.สต | เงื่อนไขการใช้/หมายเหตุ |
|--|---|--------|-------|-----|-----|-----|-------|---|
| 1 | Chlorpheniramine maleate 10 mg/ml Inj. | ED | ก | E | / | | / | |
| 2 | Chlorpheniramine maleate 4 mg. . tab | ED | ก | E | / | | / | |
| 3 | Chlorpheniramine maleate syr 2mg/5 ml | ED | ก | E | / | | / | |
| 4 | Loratadine 10mg tab | ED | ข | E | / | | | |
| Compoundd antimuscarinic bronchodilators | | | | | | | | |
| 1 | Ipratropium Br+Fenoterol HBr Nebulizer | ED | ก | V | / | | | ถอดออกจากกรอบPCU 2563 |
| INHALED CORTICOSTERIOD | | | | | | | | |
| 1 | Budesonide inh.200 mcg. | ED | ก | E | / | | | ถอดออกจากกรอบPCU 2563 |
| 2 | Seretide evohaler (Salmeterol 25mcg+ Fluticasone125mcg) | ED | ค | E | / | | | ถอดออกจากกรอบPCU 2563 |
| COUGH SUPPRESANTS | | | | | | | | |
| 1 | Dextromethophan HBR 15 mg. . | ED | ก | N | / | | / | |
| EXPECTORANTS | | | | | | | | |
| 1 | Guifenesin syr 100mg/5ml | ED | ก | N | / | | / | |
| 2 | Guifenesin 100mg tab | ED | ก | N | / | | / | |
| OTHER RESPIRATORY PREPARATION | | | | | | | | |
| 1 | Aromatic ammonia spirit 450 ml | ED | ก | N | / | | / | |
| Fluid and electrolytes | | | | | | | | |
| 1 | Acetate ringer 1000 ml. | ED | ก | E | / | | / | |
| 2 | Calcium gluconate 10% in 10 ml | ED | ก | E | / | / | | |
| 3 | D-5-1/2s 1000 ml | ED | ก | E | / | | / | |
| 4 | D-N/5 500ml | ED | ก | E | / | | | |
| 5 | D-5-N/3 500 ml | ED | ก | E | / | | / | |
| 6 | D-5-S 1000 ml | ED | ก | E | / | | | |
| 7 | D-5-W 100 ml | ED | ก | E | / | | | |
| 8 | D-5-W 250 ml | ED | ก | E | / | | | เข้าปี 2566 ใช้ drip NE เพื่อสะดวกต่อการบริหารยา |
| 9 | D-5-W 500 ml | ED | ก | E | / | | | แทน 1000 ml |
| 10 | Glucose 50 % Inj 50 ml | ED | ก | E | / | / | | |
| 11 | NSS 0.9 % irrigate 1000 ml. | ED | ก | E | / | | / | |
| 12 | NSS 0.9% 1000ml. Inj | ED | ก | E | / | | / | |
| 13 | NSS 0.9% 100ml. Inj | ED | ก | E | / | / | | |
| 14 | Potassium chloride 40 meq in 20 ml inj. | ED | ก | V | / | | | |
| 15 | Sodium bicarbonate inj 7.5% in 50 ml | ED | ก | V | / | / | | |
| 16 | Water for inj. 10 ml. | ED | ก | E | / | | | กำหนดใช้ขนาดเดียวแทน 5 ml |
| 17 | Water for inj. 1000 ml. | ED | ก | E | / | | | นำเข้าปี 2566 เพื่อใช้กับเครื่อง High-Flow Nasal Camula |
| NUTRITIONAL THERAPEUTICS | | | | | | | | |
| VITAMINS | | | | | | | | |

| ลำดับ | กลุ่มยา/ชื่อยา | ประเภท | บัญชี | VEN | รพช | PCU | รพ.สต | เงื่อนไขการใช้/หมายเหตุ |
|-------------------|---|--------|-------|-----|-----|-----|-------|--|
| 1 | Folic acid 5 mg . | ED | ก | E | / | | / | |
| 2 | Multivitamin syrup | ED | ก | E | / | | / | |
| 3 | Vitamin B complex . | ED | ก | E | / | | / | |
| 4 | Vitamin B6 100 mg tab | ED | ก | E | / | | | |
| 5 | Vitamin Bcomplex inj. 1 ml. | ED | ก | E | / | | | |
| 6 | Vitamin C 100 mg. . | ED | ก | E | / | | / | |
| 7 | Vitamin k 1 mg inj. | ED | ก | E | / | | | ไม่มีขอยกการใช้ยา มีไว้รอใช้ในห้องคลอด |
| 8 | Vitamin k 10 mg inj. | ED | ก | E | / | | | |
| MINERAL SUPLEMENT | | | | | | | | |
| 1 | Calcium carbonate 1500 mg . | ED | ก | E | / | / | | |
| 2 | Ferrous fumarate 200mg tab | ED | ข | E | / | | / | |
| 3 | Ferrous fumarate susp | ED | ข | E | / | | / | |
| 4 | Potassium chloride 20mEq/15ml. หรือความเข้มข้น 1.33mEq/ml | ED | ก | E | / | | | |
| 5 | Sodium chloride 300mg TAB | ED | ก | E | / | | | |
| 6 | ยาเม็ดเสริมไอ โอดีน(Obimin A-Z/Triferdin-150) | NED | | E | / | / | | |
| HERBS | | | | | | | | |
| 1 | ขมิ้นชัน | ED | ก | E | / | | / | |
| 2 | เจลาวานหางจรเข้ | ED | ก | E | / | | / | |
| 3 | ชาดอกคำฝอย | ED | ก | E | / | | / | |
| 4 | เถาวัลย์เปรียง | ED | ก | E | / | / | | |
| 5 | น้ำมันกัญชา อ.เดชา | ED | ก | E | / | | | |
| 6 | น้ำมันไพล | ED | ก | E | / | | / | |
| 7 | พยายอกครีม | ED | ก | E | / | | / | |
| 8 | เพชรสังฆาต | ED | ก | E | / | | / | |
| 9 | ไพลครีม | ED | ก | E | / | | / | |
| 10 | ฟ้าทะลายโจร | ED | ก | E | / | | / | |
| 11 | มะขามแขกแคปซูล | ED | ก | E | / | | / | |
| 12 | ยากระตุ้นน้ำนมหลังคลอด | NED | | E | / | / | | |
| 13 | ยาแก้ร้อนไม่หลับแก้ไข้หอมเหลือง | ED | ก | E | / | | | |
| 14 | ยาแก้ลมแก้เส้นแคปซูล | ED | ก | E | / | | | |
| 15 | ยาแก้ไอมะขามป้อม | ED | ก | E | / | | / | |
| 16 | ยาจันทลีลา | ED | ก | E | / | / | | |
| 17 | ยาทำลายพระสุเมรุ | ED | ก | E | / | | | |
| 18 | ยาธรณีสังฆาต | ED | ก | E | / | / | | |
| 19 | ยาธาตุนรจบบ | ED | ก | E | / | / | | ต้องเสียไม่คิดเชื้อ |
| 20 | ยาธาตุนรจบบ | ED | ก | E | / | | / | |
| 21 | ขุมเห็ดเทศ(ของชาขง) | ED | ก | E | / | | | ยาใหม่ 2566 มีข้อดีความขามแขกสำหรับผู้ป่วยบางกลุ่ม |
| 22 | ขานวโกฐ | ED | ก | E | / | / | | |
| 23 | ยาประคบสมุนไพร(แห้ง) | ED | ก | E | / | | / | |
| 24 | ยาประคบสมุนไพรใหญ่ | ED | ก | E | / | / | | |

